

**Боднар А.А. Лечебная эффективность и иммунорегулирующее действие окситетрациклина на организм коров при эндометриите при различных методах его введения**

Проведен сравнительный анализ показателей иммунного статуса организма коров при гнойном эндометриите. Установлено, что регионарное введение препаратов повышает эффективность лечения коров при гнойном эндометриите, способствует более активной иммунореабилитации организма коров.

В организме коров больных острым гноино-катаральным эндометритом, происходят существенные колебания популяций лимфоцитов: содержание общего количества лимфоцитов ( $p<0,01$ ), Т-лимфоцитов ( $p<0,01$ ) и Т<sub>у</sub>-клеток ( $p<0,05$ ) по сравнению с показателями клинически здоровых коров было достоверно ниже, тогда как содержание Т-супрессоров их превышало ( $p<0,05$ ), что свидетельствует об угнетении клеточных механизмов защиты. Менее лабильными оказались показатели содержания В-клеток, доля которых во всех группах существенно не отличалась.

**Ключевые слова:** корова, послеродовой период, иммунный статус, реактивность, гнойный эндометрит, регионарное введение, лимфоцит, рациональная антибиотикотерапия.

**Bodnar A.A. Therapeutic efficacy and immunoregulatory effects of oxytetracycline on the body of cows with endometritis during different methods of administration**

The comparative analysis of parameters of the immune status of cows with purulent endometritis. The regional introduction drugs increases the efficiency of treatment of cows with purulent endometritis, contributes to better immunorehabilitation of cows.

In the body of cows with acute purulent-catarrhal endometritis occur significant fluctuations in populations of lymphocytes: the content of the total number of lymphocytes ( $p<0,01$ ), T-lymphocytes ( $p<0,01$ ) and T<sub>у</sub>-cells ( $p<0,05$ ) compared to the performance of healthy cows was significantly lower, whereas the content of T-suppressors exceeded ( $p<0,05$ ), indicating that the inhibition of cellular protection mechanisms. Less labile figures appeared content of B cells, which share in all groups were not significantly varied.

**Keywords:** cow, puerperal period, immune status, reactivity, purulent endometritis, regional introduction, lymphocyte, rational antibioticotherapy.

Дата надходження до редакції: 05.06.2014 р.

Рецензент: д.вет.н., професор Харенко М.І.

УДК 636.082:636.2:619

**ВПЛИВ НЕКОГЕРЕНТНОГО ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА  
НА СПЕРМАТОГЕНЕЗ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ**

**Г. М. Калиновський**, д.вет.н., професор

**Л. Г. Євтух**, аспірантка

Житомирський національний агрономічний університет

У досліді на 5-ти бугаях-плідниках голштинської породи, класу еліта-рекорд, віком 4-11 років зі зниженою спермопродуктивністю, завезених з Німеччини досліджували вплив некогерентного поляризованого світла, випромінюваного лампою «Біоптрон компакт III», на їх загальний стан і якість сперми. Установлено, що опромінення лампою «Біоптрон» зовнішньої бокової стінки мошонки з відстані 10 см протягом 10 днів щоденно по 6 хвилин негативно не впливає на загальний стан бугаїв-плідників. При товщині шкіри і оболонок сім'янників у місці опромінення 9 мм промені НПС проникають в глибину їх паренхіми на 16 мм. Стимулювальний вплив НПС на сперміогенез продовжувався протягом часу втрічі довшого, ніж він триває і проявляється у підвищенні активності та збільшенні концентрації сперміїв в 1 мл як під час, так і після опромінення.

**Ключові слова:** бугай-плідники, сперматогенез, якість сперми, кількість спермодоз, некогерентне поляризоване світло, опромінення, паренхіма, звивисті канальні, клітини Сертолі, клітини Лейдіга.

**Постановка проблеми.** З метою підвищення темпів селекції при вдосконаленні вітчизняних порід худоби в Україні широко використовується генофонд імпортних порід. Інтенсифікація галузі молочного скотарства, одночасно з підвищенням рівня продуктивності тварин, в багатьох випадках супроводжується порушенням обміну речовин, зниженням імунного статусу і природної резистен-

тності, що виражається в погіршенні фізіологічного стану, ефективності відтворення та скороченню їх продуктивного використання [1].

Способи підвищення відтворюальної функції бугаїв-плідників за механізмом впливу включають неспецифічні та фізичні засоби, гормональну стимуляцію. З успіхом застосовується електро-, світло-, водо-, теплове лікування та різні

способи масажу. Кожен з наведених чинників включає низку лікувальних та профілактичних методів.

Показання для застосування фізіотерапії та фізіостимуляції ґрунтуються на тому, що фізіопроцедури покращують периферичний, регіональний і центральний кровообіг, мають болезаспокійливу дію, покращують трофіку тканин, нормалізують нейрогуморальну регуляцію і порушенні імунні процеси [2].

**Аналіз останніх досліджень.** Розробка методів стимулювання сперматогенезу зосереджена в основному на пошук препаратів, що впливають на обмін речовин у всьому організмі і згодовуються тваринам як добавки до раціону, та засобів безпосереднього впливу на статеві залози з використанням чинників переважно фізичної енергії.

При андрологічних проблемах, пов'язаних з порушенням функцій придаткових статевих залоз, і для стимуляції лібідо застосовують мікробірацію у поєднанні з імпульсним магнітним полем за допомогою магнітовібраціонного аплікатора. Способ дозволяє підвищити статеву активність бугаїв-плідників, а також збільшити об'єм отриманих еякулятів і кількість сперматозоїдів у них [3].

В.І. Барабаш, В.В. Фідірко розробили і запропонували метод електростимуляції статової системи бугаїв-плідників. Його суть полягає в тому, що під впливом синусоїdalьних модульованих струмів, які є інтенсивними подразниками нервової, м'язової та інших систем організму, підвищується рівень адреналіну, норадреналіну і ацетилхоліну, нормалізується функціональний стан симпатоадреналової і холінергічної систем, активізуються компенсаторні системи і адаптивні процеси в організмі, що сприяє відновленню лібідо і поліпшенню якості сперми [4]. Проте, Н.А. Комбарова, Н.М. Решетнікова, В.П. Лебедєв та інші (2003) вважають, що описаний метод має певні недоліки, бо методично трудомісткий, оскільки потрібно постійно корегувати поріг бальової чутливості, процедура досить болюча і при подальших повтореннях може викликати гальмівний рефлекс у плідника.

Застосування бугаям-плідникам при низькій якості сперми за артрозу УВЧ-терапії з використанням апарату «Вета» з ректальним накладанням електродів сприяє збільшенню об'єму еякуляту і поліпшенню показників крові [5].

Згідно з даними П.Н. Ніконорова, Ю.Г. Юшковської, Є.Г. Панової зовнішній вібромасаж попереково-крижової зони бугаїв-плідників апаратом «Велмос» має виражений позитивний вплив на сперматогенез [6]. Однак, на думку [3] він є лише зовнішнім подразником, що підсилює місцеві вегетативні рефлекси, тому його застосування компенсує недостатню підготовку плідників до повноцінної садки, безпосередньо не стимулюючи

процес сперматогенезу. У даному випадку доцільно говорити не про стимуляцію сперматогенезу, а про додаткове статеве збудження у складному ланцюзі статевих рефлексів.

В останні роки, особливо у гуманній медицині, широко використовують світлотерапію з використанням лампи «Біопtron».

**Постановка завдання.** Основне завдання досліду – з'ясувати вплив некогерентного поляризованого світла, випромінюваного лампою «Біопtron компакт III», на загальний стан і якість сперми бугаїв-плідників.

**Вихідний матеріал, методика та умови дослідження.** Дослід проводили в умовах ПрАТ «Українська генетична компанія» Житомирської області на 5-ти бугаях-плідниках голштинської чорно-рябої та червоно-рябої породи, класу еліта-рекорд, віком 4-11 років, завезених з Німеччини зі зниженою спермопродуктивністю.

Світлоопромінення проводилося апаратом «БІОПТРОН Компакт III» виробництва фірми Biotron AG, Швейцарія.

Хвили поляризованого світла, випромінювані лампою «Біопtron», поширюються в паралельних площинах. Система світлотерапії «Біопtron» охоплює діапазон довжин хвиль від 480 до 3400 нм. Цей спектр містить видимий діапазон світла і частину інфрачервоного випромінювання. До складу електромагнітного спектра світла «Біопtron» не входять ультрафіолетові промені. Світло «Біопtron» має низьку щільність енергії, що складає в середньому 2,4 Дж/см<sup>2</sup>, досягає ділянки впливу з постійною стійкою інтенсивністю. Потома потужність світла «Біопtron» дорівнює приблизно 40 мВт/см<sup>2</sup> при дії з відстані 10 см. Ці властивості світла «Біопtron» досягають впливу на клітини на глибині до 2,5 см під поверхнею шкіри. Під дією світла перепад температури шкіри становить 1°C і помітного нагрівання не виникає. Важливий аспект ефективності застосованого методу світлотерапії складає некогерентність світла, тобто, на відміну від лазера, ділянки світловової хвилі не синхронізуються ні в просторовому, ні в часовому відношенні. За таких параметрів прилад може працювати з меншою інтенсивністю випромінювання [7, 8].

Промінь світла спрямовували на бокову поверхню зовнішньої стінки мошонки бугаїв-плідників під прямим кутом на відстані 10 см при експозиції 6 хвилин. Проведено 10 щоденних сеансів. Одночасно опромінювали обидва сім'яники. Промінь світла зміщували по всій боковій поверхні калітки.

Сперму отримували згідно графіка два рази на тиждень дуплетною садкою. Якість спермопродукції визначали за технологією системи «IVOS» впродовж 4-х тижнів до застосування приладу, 3 рази у період опромінення та протягом 4-х тижнів після опромінення.

Загальний стан тварин визначали за показ-

никами температури, пульсу, дихання і проявом статевих рефлексів при отриманні сперми.

Для об'рунтування впливу НПС на сім'яники з визначенням параметрів тканинних структур в напрямку: шкіра калитки, оболонки і паренхіма сім'яника використовували сім'яники з мошонкою забитого бугая-плідника аналогічної породи, відібрані на м'ясокомбінаті, якого вибрачували за причин, що не пов'язані зі спермопродуктивністю.

**Результати дослідження.** Нами встановлено, що температура тіла, кількість пульсових по-

штовхів і дихальних рухів, як показники загального стану тварин, змінювалися в фізіологічних межах протягом проведення досліду. Відхилень з боку статової системи не виявлено.

Якість спермопродукції, порівняно з періодом до опромінення, під час опромінення і протягом місяця після його закінчення, за винятком об'єму еякуляту, що залишився майже стабільним, у всіх бугаїв-плідників покращилася за рухливістю спермів та їх концентрацією в 1 мл. Значно зменшилася кількість вибрачуваної сперми (табл. 1).

Таблиця 1

**Якість сперми бугаїв-плідників при опроміненні апаратом «Біоптрон», М±m**

Період*	О'бєм еякуляту, мл	Рухливість спермів, балів	Концентрація спермів, млн./мл	Брак, мл	Кількість заморожених спермодоз
I	4,25±0,22	5,89±0,23	1646,63±62,43	3,10±0,30	41,33±9,13
II	4,27±0,33	7,25±0,21	1947,67±105,66	1,36±0,43	145,63±20,03
III	4,65±0,24	6,23±0,23	2134,92±79,89	2,82±0,34	63,50±12,84

\* Примітки:I –до опромінення; II –під час опромінення; III –після опромінення.

Під час опромінення збільшувалися як активність руху спермів ( $5,89\pm0,23$ - $7,25\pm0,21$  балів), так і їх концентрація в 1 мл ( $1646,63\pm62,43$ - $1947,67\pm105,66$  млн./мл), що засвідчує вплив НПС на активацію сперміогенезу і метаболізму поживних речовин спермів.

Як показав наш дослід, після опромінення вплив НПС на сперматогенез триває ще протягом одного місяця і виражається найвищою концентрацією спермів ( $1646,63\pm62,43$ - $1947,67\pm105,66$ - $2134,92\pm79,89$  млн./мл). Отже, є всі підстави припустити, що стимулювальний вплив НПС на сперміогенез проявляється не лише під час опромінення, а й після нього, і триває ще протягом місяця.

При цьому рухливість спермів під час опромінення збільшилася з  $5,89\pm0,23$  до  $7,25\pm0,21$  балів, концентрація – з  $1646,63\pm62,43$  до  $1947,67\pm105,66$  млн./мл відповідно, а після закінчення курсу опромінення рухливість знизилася до  $6,23\pm0,23$  балів, але була дещо вищою ( $5,89\pm0,23$ ), ніж до опромінення. Під час десятиденного опромінення від бугаїв-плідників отримали 15 еякулятів з рухливістю спермів у них 8 балів, тоді як за 30 днів до опромінення – 19, а після опромінення – 22. Протягом 4-х тижнів після опромінення концентрація спермів зросла до  $2134,92\pm79,89$  млн./мл і була найвищою, ніж до ( $1646,63\pm62,43$ ) і під час ( $1947,67\pm105,66$ ) опромінення. Кількість заморожених спермодоз, порівняно з початком досліду, під час опромінень збільшилася на 252,35 %, після закінчення – на 53,64 %, що пов'язано зі зменшенням об'єму вибракуваної сперми протягом опромінення на 56 %, після – на 9 % порівняно з початком досліду (табл. 1).

Таким чином, проведене нами дослідження засвідчує, що некогерентне поляризоване світло, випромінюване лампою «Біоптрон», стимулюючи обмінні процеси в сім'яниках, проявляється вірогідним зростанням рухливості спермів і збільшенням їх концентрації.

Установлено, що хвилеподібний рух джгутиків спермів здійснюється при взаємодії АТФ з високомолекулярним міозиноподібним (В.А. Енгельгардт, С.А. Бурнашева, 1957; Bishop, 1962; Nelson, 1967) білоком і залежить від рівня АТФ, яка підтримує нормальній перебіг дихання і гліколізу (Mann, 1964; Nevo, 1966). За даними С.А. Бурнашевої (1960), рухлива функція спермів зберігається доти, доки в клітинах існує запас макроергічних фосфорних сполук. При виснаженні процесів гліколізу і дихання наступає розпад АТФ, що не компенсується, інтенсивність руху спермів знижується і припиняється.

Також відомо, що інтенсивність утилізації енергії АТФ залежить від швидкості її дифузії із мітохондрій до дистальної частини джгутиків (Rikmenspoel, 1971, 1972), а виділений із них контрактильний блок спермозин з вираженою АТФазою активністю подібний до міозину і активується кальцієм.

Отже, рухлива функція джгутиків спермів здійснюється за реакцією гідролітичного розпаду АТФ, що каталізується АТФазою, локалізованою в основних скоротливих структурах війок і джгутиків [9].

Доведено, що опромінення НПС обумовлене властивостями самого біологічного об'єкта, зокрема тепловими, механічними (тиск світла), оптичними факторами (коєфіцієнт відбиття), коєфіцієнтами пропускання і поглинання та проявляється безпосереднім впливом електромагнітних світлових хвиль [10].

За дії НПС підвищується енергетична активність клітинних мембрани, основа яких складається з жирних кислот, які за рахунок енергії світла впорядковані і правильно вирівняні. За зниженої функції й у разі пошкодження клітини НПС послідовно відновлює весь ланцюг її функціонування – активує метаболічні (обмінні) процеси і продукцію ферментів клітинами, підвищує енергетичний потенціал мембрани, цілісність яких відновлюється вже через 30 хвилин. Стимулюються гумо-

ральний та клітинний рівні імунного захисту. Проникаючи в глибину шкіри, поляризоване некогерентне світло нормалізує капілярний кровообіг, покращує живлення тканин, їх постачання киснем, зменшує набряки, а також безпосередньо впливає на нервові закінчення і нервові тканини [10].

Нами встановлено, що товщина шкіри бокової стінки калитки бугая аналогічної породи і віку дорівнює 4 мм, оболонок сім'яника 5 мм (рис. 1), що в сумі становить 9 мм. Згідно «Настанов» промені НПС проникають в тканини на глибину 2,5 см. Окрім цього нами також установлено, що площа поверхні сім'яника становить 87,92 см<sup>2</sup>, а висота дольки 7 см. Отже промені НПС проникають на 16 мм у глибину паренхіми сім'яника, впливають на 1/4 висоти дольки, тобто на ділянку локалізації звивистих каналців, у яких утворюються спермії і функціонують клітини Сертолі, продуcentи живильного середовища. Їх вплив поширюється і на строму, де локалізуються клітини Лейдіга і синтезується гормон тестостерон. Оскільки в периферичній ділянці дольок, в звивистих канальцях містяться сперматогонії, то промені НПС діють на всі функціональні компоненти сім'яника.




Рис. 1. Поперечний розріз сім'яника  
а - товщина шкіри і оболонок сім'яника;  
б - глибина проникання променів; в - строма;  
г - трабекули паренхіми.

Також є підстави припустити, що механізм дії НПС, який супроводжується зростанням активності і концентрації сперміїв вже під час опромінення сім'яників, зумовлений впливом на клітини Лейдіга, тобто на гормональну активність бугаїв.

Вважають, що механізм дії поляризованого світла проявляється локальним відновленням функцій клітин шкіри, активацією капілярного кровообігу та рефлексогенних зон, протиболіової системи мозку одночасно з корекцією процесу запалення, посиленням мікроциркуляції тощо. Таким чином, біологічна дія поляризованого світла проводиться на молекулярному, клітинному та системному рівнях [11].

Випромінюване лампою «Біоптрон» НПС, застосовується як допоміжний засіб при традиційних методах лікування і як монотерапія при певних показаннях [12-14].

За даними П.М. Клименка (1999), застосування НПС, випромінюваного лампою «Біоптрон» при лікуванні хронічного простатиту та його ускладнень у чоловіків сприяло поряд з іншими змінами покращенню процесів функціонування сечо-статевих органів і відновленню діяльності регулюючих систем, судинних рефлексів, нормалізації вегетативних функцій і лібідо. Автор вважає, що дія НПС, обумовлена активацією гіпофізарно-гонадної системи з посиленням викиду лютейнізуючого гормону і тестостерону, з подальшим зменшенням продукції естрогенів [15].

**Висновки.** 1. Опромінення лампою «Біоптрон» зовнішньої бокової стінки мошонки з відстані 10 см протягом 10 днів щоденно по 6 хвилин негативно не впливає на загальний стан бугаїв-плідників.

2. При товщині шкіри і оболонок сім'яників у місці опромінення 9 мм промені НПС проникають в глибину їх паренхіми на 16 мм у ділянку розташування звивистих канальців, де знаходяться сперматогонії і починається сперміогенез.

3. Під час опромінення, порівняно з часом до його застосування, якість сперми зросла за активністю руху сперміїв на 22,34 %, концентрацією сперміїв в 1 мл на 18,28 %

4. Стимулювальний вплив НПС на сперміогенез продовжувався протягом часу втрічі довшого, ніж він тривав і проявлявся в підвищенні активності та збільшенні концентрації сперміїв в 1 мл як під час, так і після опромінення.

**Перспективи подальших досліджень.** Дослідження будуть зосереджені на виявленні впливу НПС на статеві гормони бугаїв-плідників.

#### Список використаної літератури:

- Зубец М.В. Генетика, селекция и биотехнология в скотоводстве / М.В. Зубец, В.В. Буркат, Ю.Ф. Мельник. – К.: БМТ, 1997. – 722 с.
- Аникин М.М. Основы физиотерапии / М.М. Аникин, Г.С. Варшавер. – М.: МЕДГИЗ, 1950. – 712 с.
- Пат. 2355166 Российская Федерация, МПК А 01 К 67/02, А 61 № 2/04. Способ стимуляции воспроизведения

- тельной функции быков-производителей / Комбарова Н.А., Решетникова Н.М., Ескин Г.В., Лебедев В.П., Иванов А.В., Федорова Е.В.; заявитель и патентообладатель Всероссийский государственный научно-исследовательский институт животноводства. – Заявл. 09. 07. 2007; опубл. 20. 05. 2009.
4. Барабаш В.И. Электростимуляция половой системы быков-производителей / В.И. Барабаш, В.В. Фидирко // Ветеринария. – 2003. – № 12. – С. 36-38.
  5. Семенов Б.С. Применение электрического поля УВЧ при патологии половых органов и конечностей у быков-производителей / Б.С. Семенов, И.А. Подмогин, А.В. Лебедев // Современные проблемы ветеринарной хирургии : матер. междунар. науч. конф. – Х., 1994. – С. 42-43.
  6. Никоноров П.Н. Стимуляция сперматогенеза у быков / П.Н. Никоноров, Ю.Г. Юшков, Е.Г. Панова // Проблема бесплодия и маститов животных. – Новосибирск, Сибирское отделение РАСХН, 1999. – С. 267-269.
  7. Karu T.I. Exact action spectra for cellular responses relevant to phototherapy. Photomedicine and Laser Surgery / T.I. Karu, S.F. Kolyakov. – 2005. – № 23 (4). – Р. 355-361.
  8. Smith K. Light and Life: The photobiological basis of the therapeutic use of radiation from lasers. / K. Smith // Progress in Laser Therapy: Selected papers from the October, 1990. ILTA Congress. Published by Wiley and Sons, Inc. New York and Brisbane, 1991. – Р. 17.
  9. Бурнашева С.А. Значение процессов фосфорилирования в осуществлении двигательной функции семенной клетки / С.А. Бурнашева. – Тр. Ин-та эксперим. мед. АМН СССР, 1960. – С. 23-242.
  10. Лиманский Ю.П. Центральные и периферические механизмы действия на организм поляризованного света / Ю.П. Лиманский // Биоптрон-светотерапия: Матер. 2 Междунар. конф. – Киев, 2005. – С. 11-15.
  11. Техвер Ю.Т. Гистология мочеполовых органов и молочных желез домашних животных / Ю.Т. Техвер. – ТАРТУ, 1968. – 139 с.
  12. Кирющенко А.П. Клиническая эффективность использования прибора "Биоптрон" в гинекологии / А.П. Кирющенко // Мат. научно-практ. конф. "Новые направления в использовании светотерапии "Биоптрон". – Москва, Екатеринбург, 2003. – С. 29-31.
  13. Хан М.А. Применение поляризованного света прибора "Биоптрон" в педиатрии / М.А. Хан // Материалы научно-практ. конф. "Новые направления в использовании светотерапии "Биоптрон". – Москва, Екатеринбург, 2003. – С. 18-20.
  14. Fenyo M., Kerstetz J., Rozsa K., Szego P. Methodandapparatusforpromotinghealing. US Patent, No 4, 686986, 1987. – Р. 30.
  15. Клименко П.М. Применение аппарата «Биоптрон» при лечении хронического простатита и его осложнений / П.М. Клименко // Материалы Юбилейной научно-практической конференции, посвященной 5-летию деятельности Zepter-International в Украине. – К. : Изд-во ЦЕПТЕР, 1999. – С. 67-72.

### **Калиновский Г.Н., Евтух Л.Г. Влияние некогерентного поляризованного света на сперматогенез быков-производителей**

В опыте на 5-ти быках-производителях голштинской породы, класса элиты-рекорд возрастом 4-11 лет с пониженной спермопродуктивностью, завезенных из Германии исследовали влияние некогерентного поляризованного света, излучаемого лампой «Биоптрон компакт III», на их общее состояние и качество спермы. Установлено, что облучение лампой «Биоптрон» внешней боковой стенки мошонки с расстояния 10 см в течении 10 дней ежедневно по 6 минут отрицательно не влияет на общее состояние быков-производителей. При толщине кожи и оболочек семенников в месте облучения 9 мм лучи НПС проникают в глубину их паренхимы на 16 мм. Стимулирующее влияние НПС на спермиогенез продолжалось в три раза дольше, чем оно продолжалось и проявлялось в повышении активности и увеличении концентрации спермииев в 1 мл как во время, так и после облучения.

**Ключевые слова:** быки-производители, сперматогенез, качество спермы, количество спермодоз, некогерентный поляризованный свет, облучение, паренхима, извитые канальцы, клетки Сертоли, клетки Лейдига.

### **Kalinowski G.N., Evtukh L.G. Effect of incoherent polarized light on spermatogenesis sires**

In the experiment on 5th bulls-sires of the Holstein breed, of the elite-record class, aged 4-11 years with the low spermproductivity, imported from Germany, the research of the effect of incoherent polarized light has been conducted, that was emitted by the lamp "Bioptron Compact III", on their general state and quality of sperm bulls-sires. It has been established that the irradiation with the lamp "Bioptron" of the outer side of the scrotum doesn't affect negatively on the general state of the bulls-sires. When the thickness of the skin and testis membranes is 9 mm at the place of the irradiation the NPCs rays penetrate into deep of their parenchyma into 16 mm. Stimulating effect of NPCs on spermohenez was lasted during some time for 3 times longer than it was continued before and it has been shown the increase of the activity and the concentration of spermatozoa in 1 ml as during as after the irradiation.

**Key words:** bulls-sires, spermatogenesis, sperm quality, quantity spermoodoz, incoherent polarized light irradiation, parenchyma, meandering channel, Sertoli cells, Leydig cells.

Дата надходження до редакції: 17.07.2014 р.

Резензент: д.вет.н., професор Красочко П.А.